



REGIONE PUGLIA

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLE PERSONE E DELLE PARI OPPORTUNITA'

Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione

Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza /Urgenza

Tel. 080 5403144/3143/3022 fax 080 5403200

farmaceutica.regione@pec.rupar.puglia.it

Prot. AOO/152/ 7778 del 04-06-13

Alla cortese attenzione :
Dott.Vincenzo Ferrari
e- mail vinceferrari@tin.it

Oggetto: prescrizione eparine a basso peso molecolare in pazienti allettati.

Si fa riferimento alla sua mail pervenuta il giorno 03 maggio 2013 per precisare quanto segue.

La prescrizione delle eparine a basso peso molecolare nella profilassi TEV in pazienti non chirurgici allettati a rischio deve essere effettuata secondo le indicazioni previste nella DGR n. 309/2009 e smi che prevedono l'uso dell'Enoxaparina da 4000UI/die per almeno 6 giorni e continuato fino alla deambulazione o fino a quando persiste il rischio tromboembolico e, comunque, secondo le indicazioni previste in scheda tecnica o di Fondaparinux 2,5 mg/die per un periodo di 6-14 giorni.

Cordialmente,

Il Responsabile P.O.
Dott.ssa Maria Cristina Carbonara

Il Dirigente dell' Ufficio
dott.ssa Mariangela Lomastro