



URGENTE

- Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori Distretti Socio Sanitari
- Ai Direttori Aree/Strutture Socio Sanitarie
- Ai Direttori Dipartimenti del Farmaco
- Ai Direttori Dipartimenti ospedalieri
- Ai Direttori Dipartimenti territoriali
- Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane
- Ai Direttori Area Gestione Servizio Farmaceutico
- Ai Direttori Medici Presidi Ospedalieri
- Ai Direttori Farmacie ospedaliere
- Ai Direttori Centrali Operative 118
- Ai Dirigenti Strutture Prevenzione e Protezione
- Ai Medici competenti
delle Aziende Sanitarie Locali
- Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori Amministrativi
- Ai Direttori Area Gestione Risorse Umane
- Ai Direttori Area Gestione Servizio Farmaceutico
- Ai Direttori Farmacie ospedaliere
- Ai Medici competenti
**delle Aziende Ospedaliere Universitarie
degli IRCCS pubblici
degli IRCCS/EE privati**
- Al Coordinatore della Rete Infettivologica Puglia
- Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia
- Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia
- Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia
- Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica
(ReNDiT) Puglia
- Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso
nascita, Terapia del Dolore di Puglia
- Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
**dei MMG e dei PLS
delle Farmacie di comunità
delle Strutture private accreditate**
- Agli Ordini Professionali
- e, p.c.*
- Al Presidente ANCI Puglia
- Al Dirigente Ufficio Scolastico Regionale della Puglia
- e, p.c.*
- Ai Magnifici Rettori
- *dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro*
 - *dell'Università degli Studi di Foggia*
 - *dell'Università del Salento*
 - *dell'Università LUM Jean Monnet*

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0625764/2026 del 22/10/2026	
AOO_RP - Class: 15.4	
Firmatario: VIVIANA VITALE, Mariangela Dafne Vincenti, NEHLDOFF ALBANO, Vito Montanaro	



e, p.c.

Al	Responsabile team GIAVA e VaLoRe di InnovaPuglia S.p.A.
Alla	Direttrice Generale AReSS Puglia
Al	Responsabile del Centro Regionale di Farmacovigilanza
Al	Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Ai	Dirigenti delle Sezioni e dei Servizi del Dipartimento
All'	Assessore alla Salute e al Benessere

OGGETTO: Circolare del Ministero della Salute n. 4398/2026. "Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2026/2027 anti COVID-19". Indicazioni operative per la Regione Puglia.

Il Ministero della Salute con circolare prot. 4398 del 01.10.2026 (in allegato), ad oggetto "*Indicazioni e raccomandazioni per la campagna di vaccinazione autunnale/invernale 2026/2027 anti COVID-19*" (d'ora in poi Circolare ministeriale), ha delineato le strategie e gli obiettivi della campagna stagionale di vaccinazione anti COVID-19, anche alla luce delle più recenti raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Agenzia europea per i medicinali (EMA), Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sentito il Consiglio Superiore di Sanità (CSS).

Nel documento, il Ministero invita le Regioni all'avvio delle attività di offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-COVID19 per la stagione 2026-27, raccomandando l'utilizzo di prodotti vaccinali idonei alla prevenzione dell'infezione da variante XFG di Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), in ottemperanza a quanto indicato dalle linee-guida internazionali¹².

In dettaglio, per l'Italia risulta disponibile un vaccino a mRNA autorizzato da EMA (Comirnaty, Pfizer).

Il Ministero definisce le linee-guida per l'offerta vaccinale, sottolineando i seguenti punti:

- Necessità di offrire gratuitamente una dose del suddetto vaccino alle categorie ad alto rischio per malattia grave e complicata in caso di infezione;
- Possibilità di offerta vaccinale anche al soggetto con infezione pregressa clinicamente e/o laboratoristicamente documentata;
- Possibilità di somministrare il vaccino anti-SARS-CoV-2 contro variante XFG contestualmente ad altri prodotti vaccinali, con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale;
- Necessità di condurre attenta e continuativa sorveglianza delle reazioni avverse dopo immunizzazione, secondo quanto già stabilito dalle normative vigenti.

Ferma restando la possibilità per chiunque di accedervi gratuitamente, la vaccinazione anti COVID-19 è raccomandata ai seguenti gruppi di Persone:

- 1) Persone di età pari o superiore a 60 anni;
- 2) Ospiti delle strutture per lungodegenti;
- 3) Donne che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo "post-partum" comprese le donne in allattamento;
- 4) Operatori sanitari e sociosanitari addetti all'assistenza negli ospedali, nel territorio e nelle strutture di lungodegenza;
- 5) studenti di medicina, delle professioni sanitarie che effettuano tirocini in strutture assistenziali e tutto il personale sanitario e sociosanitario in formazione;
- 6) Persone dai 6 mesi ai 59 anni di età compresi, con elevata fragilità, in quanto affette da patologie o con condizioni che aumentano il rischio di COVID-19 grave, quali:
 - a) Malattie croniche a carico dell'apparato respiratorio, inclusa l'asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica, la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO, la fibrosi polmonare idiopatica, l'ipertensione polmonare, l'embolia polmonare e le malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia;



- b) Malattie dell'apparato cardio-circolatorio (esclusa ipertensione arteriosa isolata), comprese le cardiopatie congenite e acquisite, le malattie coronariche, lo scompenso cardiaco e i pazienti post-shock cardiogeno;
- c) Malattie cerebrovascolari;
- d) Diabete/altre endocrinopatie severe quali diabete di tipo 1, diabete di tipo 2, morbo di Addison, panipopituitarismo;
- e) Malattie neurologiche quali sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone, sclerosi multipla, distrofia muscolare, paralisi cerebrali infantili, miastenia gravis, altre malattie neuromuscolari, patologie neurologiche disimmuni e malattie neurodegenerative;
- f) Obesità (BMI >30);
- g) Dialisi o insufficienza renale cronica;
- h) Malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie, quali talassemia major, anemia a cellule falciformi e altre anemie croniche gravi;
- i) Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi, in attesa di trattamento o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- j) Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- k) Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- l) Attesa di trapianto d'organo;
- m) Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- n) Immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- o) Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- p) Asplenia anatomica o funzionale, pregressa splenectomia o soggetti con indicazione alla splenectomia in elezione;
- q) Infezione da HIV con sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), o con conta dei linfociti T CD4+.

Di seguito vengono riportate le indicazioni per l'utilizzo del vaccino anti- COVID-19 Comirnaty XFG:

- Per i bambini dai 5 agli 11 anni compresi è prevista singola dose di Comirnaty XFG 10 microgrammi/dose anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario);
- Per bambini dai 12 anni compresi e per gli adulti è prevista singola dose di Comirnaty XFG 30 microgrammi/dose anche per coloro che non sono mai stati vaccinati (ciclo primario);
- Il vaccino può essere somministrato a distanza almeno di tre mesi dalla dose precedente di anti-SARS-CoV-2;
- Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che hanno ricevuto 1 o 2 dosi di un ciclo primario di 3 dosi da 3 mcg, è possibile somministrare dosi aggiuntive di Comirnaty XFG 10 mcg/dose, per completare il ciclo primario di 3 dosi (di cui la seconda a 3 settimane dalla prima e la terza a 8 settimane dalla seconda);
- Per i bambini dai 6 mesi ai 4 anni compresi che non hanno ricevuto un vaccino anti COVID-19, è indicata la somministrazione di un ciclo primario di 2 dosi di Comirnaty XFG 10 microgrammi/dose (di cui la seconda a 8 settimane dalla prima);
- È possibile la co-somministrazione del vaccino Comirnaty XFG, con altri vaccini (con particolare riferimento al vaccino antinfluenzale).



Alla luce di quanto definito dalla sopracitata Circolare ministeriale la campagna di vaccinazione anti COVID-19 verrà avviata non appena distribuito il vaccino che sarà stoccato presso l'ASL di Bari.

Il vaccino dovrà essere offerto alla popolazione target a cura di:

- Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle Aziende Sanitarie Locali;
- Ambulatori vaccinali ospedalieri e Centri Ospedalieri Specialistici che hanno in cura i pazienti appartenenti alle categorie target dell'offerta;
- Medici competenti delle strutture sanitarie, con riferimento specifico alla popolazione degli operatori sanitari e degli studenti delle Scuole di Medicina.

La distribuzione del vaccino dovrà avvenire a cura dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica mediante ritiro dalla Farmacia ospedaliera dell'Ospedale "Di Venere" dell'ASL di Bari e assicurando il trasporto del vaccino presso le proprie sedi, nel rispetto delle linee guida in materia. Per contatti, rivolgersi alla dott.ssa Letizia Rizzo del Dipartimento di Prevenzione ASL Bari.

L'organizzazione dell'offerta e il monitoraggio dell'andamento della campagna è assicurata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione con l'obiettivo di favorire la massima accessibilità della popolazione target, anche attraverso l'organizzazione di "open day" e altre attività che possano favorire la massima adesione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2/Covid-19.

Si rammenta che il vaccino anti COVID-19 deve essere ordinariamente proposto alla popolazione target in co-somministrazione con la vaccinazione anti-influenzale e che, in caso di somministrazione in corso di accessi separati, non vi sono intervalli minimi da rispettare.

Si invita a prenderne atto, per quanto di rispettiva competenza, assicurando la più ampia diffusione del documento e la messa in atto delle azioni ivi previste.

Funzionari istruttori

Viviana Vitale

Mariangela Dafne Vincenti

Il Dirigente della Sezione

Promozione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Nehludoff Albano



Signed with NamirialSign

VIVIANA VITALE

21/10/2026 09:01:33 UTC+0200

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro