



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

DIREZIONE

Tel. 099.7786515 / 099.7786503 – Fax 099.371622
via Diego Peluso, 117 – 74100 TARANTO

Prot. 1522

Taranto

09 APR. 2013

Gentile Collega,

dopo la campagna vaccinale antipneumococcica dello scorso anno che ha visto il tuo importante contributo all'incremento delle coperture vaccinali negli ultrasessantacinquenni e nei soggetti appartenenti alle categorie a rischio si sottolinea l'opportunità di continuare la vaccinazione anche per l'anno in corso, ribadendo che la vaccinazione antipneumococcica non è legata ad alcuna stagionalità, come invece quella antinfluenzale ma è riferita all'intero anno.

Per facilitare la tua azione preventiva, troverai nel prospetto che segue le categorie da vaccinare, le modalità per l'approvvigionamento delle dosi di vaccino e le modalità per il monitoraggio delle attività vaccinali.

Nel ricordarti nuovamente il ruolo che questa vaccinazione ricopre nel prevenire malattie gravi all'apparato respiratorio in soggetti già defedati a causa di patologie croniche già presenti, ti auguriamo buon lavoro e ti porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile delle Cure Primarie
ASL Taranto
Ignazio APRILE

Il Direttore
del Dipartimento di Prevenzione
Michele CONVERSANO

CAMPAGNA ANTIPNEUMOCOCCICA 2013

CHI VACCINARE

L'offerta attiva e gratuita è rivolta:

1. ai soggetti adulti di età superiore a 50 anni, non compresi nelle coorti individuate nei successivi punti 2 e 3, a rischio di contrarre la malattia pneumococcica per la presenza delle patologie o condizioni predisponenti:
 - cardiopatie croniche;
 - malattie polmonari croniche;
 - cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive da alcolismo;
 - diabete mellito, in particolare se in difficile compenso;
 - fistole liquorali;
 - anemia falciforme e talassemia;
 - immunodeficienze congenite o acquisite;
 - asplenia anatomica o funzionale;
 - leucemie, linfomi, mieloma multiplo;
 - neoplasie diffuse;
 - trapianto d'organo o di midollo;
 - immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa;
 - insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica;
 - HIV positivi;
 - portatori di impianto cocleare.

A questi soggetti sarà somministrata una dose di PCV 13 se mai vaccinati o se già vaccinati con PPV 23 da almeno un anno.

Si precisa che per ciò che riguarda la somministrazione del PCV 13 ai soggetti di età compresa tra 18 e 49 anni si è in attesa di registrazione delle indicazioni terapeutiche.

2. a tutti i soggetti nati rispettivamente nel 1948, nel 1943 e nel 1938 secondo il seguente schema:

Età	Classe	Stato vaccinale	Vaccino da somministrare	Note
65	1948	Non vaccinati	PCV 13	Da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
		Già vaccinati con PPV 23 per patologia	PCV 13	
70	1943	Non vaccinati	PCV 13	Da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
		Già vaccinati con PPV 23	PCV 13	
75 ed oltre	1938 in poi	Non vaccinati	PPV 23	Da utilizzare come richiamo
		Già vaccinati con PPV 23	PPV 23	

3. a tutti i soggetti non vaccinati delle coorti per età previste nella campagna vaccinale dello scorso anno secondo il seguente schema:

Classe	Stato vaccinale	Vaccino da somministrare	Note
1947	Non vaccinati	PCV 13	Da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
	Già vaccinati con PPV 23 per patologia	PCV 13	
1942	Non vaccinati	PCV 13	Da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23
	Già vaccinati con PPV 23	PCV 13	
1937 in poi	Non vaccinati	PPV 23	Da utilizzare come richiamo
	Già vaccinati con PPV 23	PPV 23	

Si precisa che le dosi somministrate nelle coorti 1947 e 1942 possono essere somministrate entro il 30 giugno 2013 e concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto aziendale per la Campagna 2012.

COME RIFORNIRSI DELLE DOSI DI VACCINO

Come già avvenuto nella scorsa campagna vaccinale le dosi di vaccino potranno essere richieste e ritirate presso gli ambulatori SISP delle U.O. del Dipartimento di Prevenzione, previo contatto telefonico, come da tabella:

U.O. S.I.S.P. di Castellaneta per i MMG di Castellaneta, Ginosa, Laterza e Palagianello

Castellaneta	Via del Mercato c/o Ospedale Vecchio	099 8496244
--------------	--------------------------------------	-------------

U.O. S.I.S.P. di Massafra per i MMG di Massafra, Mottola, Statte e Palagianello

Massafra	Viale Magna Grecia, 173 c/o Ospedale	099 8850642
----------	--------------------------------------	-------------

U.O. S.I.S.P. di Martina Franca per i MMG di Martina Franca e Crispiano

Martina Franca	Via Toniolo, 6/R	080 4835388
----------------	------------------	-------------

U.O. S.I.S.P. di Grottaglie per i MMG di Carosino, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Montemesola, Montelias, Monteparano, Roccaforzata, Pulsano, San Giorgio Jonico e San Marzano di San Giuseppe

Grottaglie	Via Portelle delle Ginestre ang. I Maggio	099 860484
------------	---	------------

U.O. S.I.S.P. di Manduria per i MMG di Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava e Toricella

Manduria	Via per Uggiano, 4	099 800464
----------	--------------------	------------

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE per i MMG afferenti ai D.S.S. 3 e 4 di Taranto città

Taranto	Via Diego Peluso, 117	099 7786509-503
---------	-----------------------	-----------------

COME MONITORARE LA CAMPAGNA VACCINALE

Al fine di garantire un corretto monitoraggio dell'andamento della Campagna vaccinale 2013 ed una puntuale rilevazione delle coperture vaccinali raggiunte il Medico di Medicina Generale dovrà provvedere ad inviare via e-mail al tutor del proprio NuFoSE n. 3 report in excel (Allegato 1):

1. entro il 10 luglio 2013, con tutte le dosi somministrate (coorti 1937/38/42/43/47/48) dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 (Allegato 3);
2. entro il 10 gennaio 2014 con tutte le dosi somministrate (coorti 1938/43/48) dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013. (Allegato 4).

Il tutor invierà via e mail al proprio UDMG rispettivamente entro il 15 luglio 2013 e entro il 15 gennaio 2014 i report ricevuti

Gli UDMG provvederanno ad inviare via e mail all'UACP rispettivamente entro il 20 luglio 2013 e entro il 20 gennaio 2014 i report ricevuti.

L'UACP dovrà assicurare il regolare flusso informativo nei confronti del Dipartimento di Prevenzione per le competenze in materia di valutazione dei livelli di copertura vaccinale ed epidemiologiche.

Si precisa inoltre che è opportuno acquisire il dissenso informato scritto in caso di rifiuto alla vaccinazione del paziente (Allegato 2).

