



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Lungomare Starita n.6 Bari

Prot 22162 del /VORA del 16.10.2013

All n. 4

Oggetto: *Campagna vaccinale antinfluenzale e Antipneumococcica- stagione 2013-2014*
Raccomandazioni e indicazioni operative.

Al Direzione Generale

Al Direttore Sanitario

Ai Direttori dei Distretti Socio-Sanitari

Al Direttore Area Farmaceutica

Ai M.M.G. e P.L.S

Al Comitato Zonale

Alla UACP MMG E PEDIATRIA L.S.

Al Referente MMG Dott. N. Calabrese

Al Referente PLS Dott. E.Praitano

Al Direttore Dipendenze Patologiche

Ai Direttori Sanitari dei Presidi Ospedalieri

Ai Coordinatori Regionali del 118

Al Dirigente URP

Al Direttore Dipartimento di Salute Mentale

Al Direttore Servizio di Sorveglianza Sanitaria

Ai Medici Competenti della ASL

Ai Dirigenti Sanitari

Servizi di Igiene Pubblica

ASL BARI - LORO SEDI

Con nota prot. AOO 152/11926 del 04.10.2013, la Regione Puglia – Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità – ha trasmesso alle AA.SS.LL. le raccomandazioni sulle campagne vaccinali antinfluenzale e antipneumococcica 2013/14. Di seguito, a completamento delle informazioni contenute nella precedente nota Dipartimentale prot. 169886 /1 del 07.10.2013 si riportano le indicazioni operative per lo svolgimento della campagne antinfluenzale e antipneumococcica.

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE.

RIFERIMENTI NORMATIVI.

Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2012-2014

DGR 241/13 del 18/02/2013 - "Calendario vaccinale per la vita"

Circolare Ministeriale - dgpre 0018296-p DEL 09/08/2013

DGR 241/2013

Regione Puglia - Nota assessorile prot AOO152/n.11926 del 04/10/2013 (all .1)

OBIETTIVI GENERALI :

- la riduzione del rischio individuale di malattia, di ospedalizzazione e di morte;
- la riduzione dei costi sociali connessi a morbosità e mortalità.

OBIETTIVI DI COPERTURA per tutti i gruppi target.

- il 75% come obiettivo minimo perseguibile
- il 95% come obiettivo ottimale

DESTINATARI DELL'OFFERTA.

La vaccinazione è offerta *ATTIVAMENTE E GRATUITAMENTE* a:

- persone di età pari o superiore a 65 anni
- persone di tutte le età con patologie di base che aumentano il rischio di complicanze in corso di influenza ;
- persone non a rischio che svolgono attività di particolare valenza sociale.

I MMG e PLS provvederanno alla vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica dei soggetti a rischio per patologia e agli ultra sessantaquattrenni .

I Medici Competenti della Azienda Sanitaria sono invece responsabili dell'esecuzione della vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari e dell'invio al Dipartimento di Prevenzione dei dati relativi dell'attività vaccinale entro il 20.2.2014 utilizzando l'allegato B del DGR 241/2013. (all.2)

Il Dipartimento di Prevenzione, invece, provvederà alla somministrazione e/o alla eventuale fornitura del vaccino sino ad esaurimento delle scorte.

- a utenti che rientrano nelle suddette categorie, assistiti dai MMG e PLS non aderenti al Protocollo d'intesa Aziendale;
- a soggetti addetti ai Servizi Pubblici di primario interesse collettivo (non inseriti negli elenchi dei MMG aderenti al protocollo d'intesa).

Il Dipartimento provvederà alla fornitura delle dosi per il personale a rischio afferente ai servizi Distrettuali, Sovradistrettuali , 118 e dei Presidi Ospedalieri previa trasmissione di richiesta con elenco nominativo.

TIPOLOGIA DEI VACCINI.

Per la campagna vaccinale 2013/2014 la ASL di Bari intende seguire oltre le indicazioni del PNPV 2012/14 le linee guida ministeriali che, nella parte relativa alla descrizione delle tipologie dei vaccini delineano (paragrafo 2.2.4.) profilo e indicazioni specifiche dei prodotti disponibili e in particolare :

- ▲ VACCINO SPLIT (VAXIGRIP da 0,50 ml) che l'ASL di Bari intende riservare ai bambini a partire da 6 ° mese di vita ; nella fascia di età di 6 -36 mesi verrà utilizzata la mezza dose adulti (0.25 ml);
- ▲ VACCINO VIROSOMALE (INFLEXAL V da 0.50ml) che trova buon riscontro nell'offerta vaccinale da parte del territorio e degli ambulatori vaccinali per la flessibilità della fascia utilizzo e che questa ASL indica per la vaccinazione di soggetti al di sotto dei 65 anni a rischio di patologie croniche, compresi i bambini dai 6 anni in su, adolescenti e giovani adulti;
- ▲ VACCINO ADIUVATO CON M59 (FLUAD) che questa ASL indica per la vaccinazione di tutti i soggetti di età superiore ai 64 anni con particolare indicazione per l'immunizzazione dei soggetti anziani e di quelli poco rispondenti ;
- ▲ VACCINO INTRADERMICO (INTANZA 15µg) che trova indicazione specifica " anche nei pauci-rispondenti alla somministrazione intramuscolare " e in particolare nei soggetti defedati con ipotrofia muscolare, affetti da diatesi emorragica o da malattie neurologiche, soggetti emotivamente sensibili a pratiche iniettive, grandi obesi .E' indicato per i soggetti oltre i 60 anni di età.

Si evidenzia che in tutte le fasce d'età (ad esclusione dell'infanzia), si somministra una sola dose di vaccino, sia a coloro che non sono mai stati vaccinati sia ai soggetti che hanno già effettuato precedentemente la vaccinazione.

TEMPI DELLA CAMPAGNA.

L' avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale è previsto per l'inizio del mese di Novembre e sarà comunicata ufficialmente con apposita nota del Dipartimento di Prevenzione, non appena ricevute le disponibilità dei vaccini dalle singole Ditte.

DISTRIBUZIONE DEI VACCINI.

La distribuzione dei vaccini sarà effettuata presso le sedi aziendali predisposte (Dipartimento di Prevenzione, Servizi Farmaceutici, DSS), secondo le modalità concordate con i referenti individuati per territorio e secondo le consolidate afferenze territoriali.

Gli stessi avranno cura anche di inviare le bolle di consegna firmate, ai Responsabili dei Servizi Farmaceutici di Competenza territoriale.

FLUSSI DEI DATI.

Adempimenti MMG/PLS

Per quanto riguarda il monitoraggio dei flussi informativi, nelle more dell'attivazione dell'anagrafe dei pazienti cronici, in fase di sviluppo nell'anagrafe vaccinale informatizzata della Regione Puglia (GIAVA versione 5.0), i MMG e PLS entro il 31.01.2014 devono trasmettere ai Distretti gli elenchi (preferibilmente in formato elettronico, alternativamente in formato cartaceo) dei soggetti vaccinati (art 19.ACN Medicina Generale) e i prospetti riassuntivi delle vaccinazioni effettuate, redatti da ogni medico di assistenza primaria utilizzando gli allegati 2 e 3 della Circolare Ministeriale (quest'ultimo compilato per ciascuna tipologia di vaccino all. 3-4).

Adempimenti DSS

I Distretti avranno cura della trasmissione dei prospetti aggregati al Dipartimento di Prevenzione entro e non oltre il 31/01/2013 e dopo i controlli di rito, provvederanno alla liquidazione dei compensi a favore dei Medici (cfr Circ.Ass. Alla Salute AOO152/04/10/13 n.11926)

Adempimenti Dipartimento di Prevenzione.

I prospetti riassuntivi, previa elaborazione dei dati aziendali , saranno inviati dai Dipartimenti di Prevenzione all'Osservatorio Epidemiologico Regionale.

CAMPAGNA VACCINALE ANTIPNEUMOCOCCICA

RIFERIMENTI NORMATIVI.

Piano Nazionale Prevenzione Vaccini 2012-2014

Regione Puglia - Nota assessorile prot AOO152/n.3731 del 13/03/2012

DGR 241/13 del 18/02/2013 - "Calendario vaccinale per la vita"

Regione Puglia - Nota assessorile prot AOO152/n.11926 del 04/10/2013

VACCINI UTILIZZATI.

- Vaccino coniugato 13 VALENTE (PREVENAR 13)
- 23 VALENTE (PNEUMO 23)

POPOLAZIONE TARGET.

La popolazione target dell'offerta è rappresentata dai soggetti di età superiore a 64 anni e dagli adulti di 50 anni di età e oltre a rischio di contrarre la malattia pneumococcica per la presenza di patologie o condizioni predisponenti .

- cardiopatie croniche
- malattie polmonari croniche
- cirrosi epatica, epatopatie da alcolismo
- diabete mellito
- fistole liquorali
- anemia falciforme e talassemia
- immunodeficienza congenite e acquisite
 - asplenia anatomica e funzionale
 - leucemia, linfomi, mieloma multiplo
 - neoplasie diffuse
 - trapianto d'organo o di midollo
 - immunosoppressione iatrogeno clinicamente significativa
 - insufficienza renale cronica
 - HIV positivi
 - portatori di impianto cocleare

Nel corso del 2013 l'offerta attiva e gratuita del vaccino antipneumococcico è rivolta alle coorti 1938, 1943, 1948 ; lo standard di copertura è fissato per tutte e tre le coorti al 60%.

L'offerta gratuita è garantita anche a tutte le coorti < 1938 .

E' previsto per l'anno 2013anche il recupero di tutti i soggetti non vaccinati per le età previste nella campagna vaccinale dello scorso anno .

MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE VACCINO PER ETA' - anno 2013.

L'offerta attiva e gratuita della vaccinazione anti-pneumococcica dovrà avvenire secondo il seguente schema .

| Età in anni | Classe | Stato vaccinale | Vaccino | Note |
|---------------------|-------------|---|------------------|---|
| > 50 a rischio _ | < 1963 _ | non vaccinati vaccinati | PCV 13 PCV 13 | da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23 |
| 65 | 1948 | non vaccinati vaccinati per patologia | PCV 13 PCV 13 | da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23 |
| 70 | 1943 | non vaccinati vaccinati per patologia | PCV 13 PCV 13 | da somministrare dopo almeno un anno di distanza dal vaccino PPV 23 |
| > 75 _ | < 1938 _ | non vaccinati vaccinati da 5 anni con PPV 23 | PPV 23 PPV 23 | N.B. da utilizzare come richiamo ogni 5 anni |

La strategia di vaccinazione dovrà essere condivisa in modo da stabilire quanto segue.

- l'individuazione di obiettivi di copertura vaccinale in forma incrementale nel corso degli anni;
- il superamento della stagionalità dell'offerta antipneumococcica, utilizzando le campagne antinfluenzale soltanto come occasione opportuna o di "catch up"(recupero paziente), ma individuando l'intero anno, in cui effettuare la chiamata attiva dei soggetti target.

DISTRIBUZIONE DEI VACCINI.

Il vaccino antipneumococcico, solo ed esclusivamente durante lo svolgimento della campagna antinfluenzale, sarà disponibile nelle stesse sedi di distribuzione del vaccino antinfluenzale.

Per tutto il corso dell'anno invece i MMG potranno effettuare l'approvvigionamento presso gli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle presenti indicazioni operative nonché il rispetto delle date e degli adempimenti indicati, al fine di **evitare possibili giacenze di dosi inutilizzate** ed assicurare il corretto svolgimento della Campagna Vaccinale stagionale .

Distinti Saluti

IL DIRETTORE
Dipartimento di Prevenzione ASL BA
Dott. *Domenico LAGRAVINESE*



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione

Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
InfoWeb www.regione.puglia.it

Comunicazione trasmessa solo a mezzo
e-mail,
ai sensi dell'art.45 co.1, d.lgs n.82/2005

Regione Puglia - Prot. USCITA

AOO152/ 04.10.13 / N° 11986

Ai Direttori Generali

Ai Direttori dei Dipartimenti di
Prevenzione

AA.SS.LL.

Ai Direttori Generali

AA.OO.
Policlinico di Bari
OO.RR. Foggia

I.R.C.C.S. "De Bellis"
I.R.C.C.S. "Giovanni Paolo II"

E.E. "Casa Sollievo della Sofferenza"
E.E. "Miulli"
E.E. "Panico"

Al Direttore Scientifico
Osservatorio Epidemiologico Regionale

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Bari

Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Foggia

NOTA URGENTE

**Oggetto: Notifica Circolare Ministeriale DGPRES 0018296-P del 9 agosto 2013:
"Prevenzione e controllo dell'influenza. Raccomandazioni per la stagione 2013-2014".**

A seguito delle recenti indicazioni fornite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla composizione dei vaccini antinfluenzali, il Ministero della Salute ha emanato l'annuale documento contenente le raccomandazioni sulle misure preventive da adottare, nonché sulla sorveglianza dell'epidemia influenzale per la stagione 2013-2014, che si invia in allegato alla presente.

Nell'invitare all'esatta osservanza di quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale in oggetto, si ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sui seguenti aspetti.

Sorveglianza virologica

L'attività di **sorveglianza virologica** in Puglia è coordinata dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale. I medici sentinella dovranno inviare i tamponi nasofaringei, effettuati sui casi di sindrome simil-influenzale, al Laboratorio di Epidemiologia Molecolare- U.O.C. Igiene dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Bari, quale laboratorio di riferimento regionale, all'attenzione della Prof.ssa Maria Chironna - tel 0805592328, fax 0805478472, e-mail: maria.chironna@uniba.it.

Vaccinazione anti-influenzale

Si ribadisce che sia la Circolare Ministeriale in oggetto, sia la DGR 241/2013 con la quale è stato recepito il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014, individuano i gruppi target dell'offerta attiva e gratuita della **vaccinazione anti-influenzale**.



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
InfoWeb www.regione.puglia.it

Il combinato disposto dei prefati documenti individua come **standard di copertura** per la vaccinazione anti-influenzale il **75% come obiettivo minimo perseguibile** e il **95% come obiettivo ottimale** per i soggetti ultra64enni e appartenenti ai gruppi a rischio.

La copertura vaccinale raggiunta in Puglia nell'ultima stagione è stata pari al 57% nei soggetti ultra64enni; risulta pertanto necessario che le SS.LL. dispongano tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di copertura anti-influenzale, che rientra tra gli indicatori per il monitoraggio della erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

La campagna di vaccinazione dovrà essere avviata nel corso del mese di ottobre, come raccomandato dalla Circolare Ministeriale, e potrà proseguire fino alla fine di dicembre.

La vaccinazione dei soggetti a rischio per patologia e degli ultrasessantatrenni avverrà a cura dei medici di assistenza primaria, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo per la Medicina Generale.

Nelle more dell'attivazione dell'Anagrafe dei Pazienti Cronici, in fase di sviluppo nell'anagrafe vaccinale informatizzata della Regione Puglia (GIAVA, versione 5.0), i Dipartimenti di Prevenzione cureranno l'acquisizione **entro il 31 gennaio 2014** degli elenchi (preferibilmente in formato elettronico, alternativamente in formato cartaceo) dei soggetti vaccinati (articolo 19, ACN Medicina Generale) e dei prospetti riassuntivi delle vaccinazioni effettuate, redatti da ogni medico di assistenza primaria utilizzando gli allegati 2 e 3 della Circolare Ministeriale (un allegato 3 per ognuna delle tipologie di vaccino utilizzato).

Gli elenchi dei vaccinati e i prospetti riassuntivi saranno successivamente inviati dai Dipartimenti di Prevenzione ai competenti Distretti Socio-Sanitari che, espletati i controlli amministrativi di rito, provvederanno alla liquidazione dei compensi a favore dei medici di assistenza primaria. Resta impregiudicata la possibilità da parte dei Distretti Socio-Sanitari di effettuare dei controlli a campione ex-post, in analogia con quanto previsto per le altre Prestazioni di Particolare Impegno Professionale.

I dati sulle vaccinazioni effettuate nelle Aziende Sanitarie Locali dovranno essere trasmessi dai Dipartimenti di Prevenzione all'Osservatorio Epidemiologico Regionale **entro il 31 marzo 2014**, esclusivamente via e-mail (ai sensi della legge 98/2013) all'indirizzo malinf@oerpuglia.org, utilizzando unicamente gli allegati 2 e 3 della Circolare Ministeriale in oggetto. In particolare, si sottolinea la necessità che i Dipartimenti di Prevenzione compilino un allegato 3 per ognuna delle tipologie di vaccino utilizzato (split, subunità, virosomiale, adiuvato, intradermico).

Vaccinazione anti-influenzale negli operatori sanitari

La DGR 241/2013 ha previsto che i medici competenti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, degli Enti Ecclesiastici e delle Strutture Sanitarie accreditate siano responsabili dell'esecuzione delle vaccinazioni raccomandate al personale sanitario, tra cui la vaccinazione anti-influenzale stagionale.

Il monitoraggio di tale attività avverrà secondo le previsioni della succitata DGR; pertanto, i medici competenti, in collaborazione con le Direzioni delle Macrostrutture, **entro il 28 febbraio 2014** provvederanno all'invio al Dipartimento di Prevenzione dei dati relativi alle attività vaccinali effettuate entro il 31 dicembre 2013, utilizzando l'allegato B della citata DGRn.241/2013. Il responsabile del corretto invio del modulo è il Direttore della Macrostruttura.

I dati delle attività vaccinali effettuate, suddivisi per Macrostruttura, dovranno essere pubblicati sul sito web dell'Azienda o della struttura sanitaria **entro il 31 marzo 2014**.

I Dipartimenti di Prevenzione provvederanno all'invio dei dati aggregati all'Osservatorio Epidemiologico Regionale esclusivamente via e-mail all'indirizzo malinf@oerpuglia.org **entro il 31 marzo 2014**, utilizzando l'allegato C della medesima DGR.

Vaccinazione degli studenti dei corsi di studio dell'area sanitaria

I Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero Universitarie Policlinico di Bari e Ospedali Riuniti di Foggia e delle altre Aziende che sono sedi di corsi di studio dell'area sanitaria, assicurano, secondo modalità stabilite d'intesa con le Università degli Studi di Bari e di Foggia, che agli studenti dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Specialistica, Scuola di Specializzazione e Dottorato di Ricerca sia offerta, **tra le altre**, attivamente e gratuitamente la vaccinazione anti-influenzale.

Il coordinamento e l'erogazione dell'offerta vaccinale agli studenti è affidato alla U.O.C. di Igiene a direzione universitaria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari per l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e alla Struttura di Igiene a direzione universitaria della ASL Foggia per l'Università degli Studi di Foggia. Le direzioni sanitarie aziendali sono responsabili della



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità
Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione
Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro

Via Gentile, 52 - 70126 Bari
InfoWeb www.regione.puglia.it

trasmissione all'Osservatorio Epidemiologico Regionale del riepilogo annuale dei dati delle attività vaccinali realizzate, **entro il 31 marzo 2014.**

Vaccinazione anti-pneumococcica negli adulti

La campagna vaccinale per l'influenza rappresenta un'occasione opportuna per l'offerta della vaccinazione anti-pneumococcica. La popolazione target dell'offerta è rappresentata dai soggetti di età superiore a 64 anni e dagli adulti di 50 anni di età e oltre a rischio di contrarre la malattia pneumococcica per la presenza di patologie o condizioni predisponenti:

- cardiopatie croniche
- malattie polmonari croniche
- cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive da alcoolismo
- diabete mellito, in particolare se in difficile compenso
- fistole liquorali
- anemia falciforme e talassemia
- immunodeficienze congenite o acquisite
- asplenia anatomica o funzionale
- leucemie, linfomi, mieloma multiplo
- neoplasie diffuse
- trapianto d'organo o di midollo
- immunosoppressione iatrogena clinicamente significativa
- insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica
- HIV positivi
- portatori di impianto cocleare

Secondo le previsioni del più volte citato atto regionale, nel corso del 2013 l'offerta attiva e gratuita del vaccino coniugato 13-valente è rivolta alle coorti di nascita 1938, 1943 e 1948; **lo standard di copertura è fissato al 60%** per tutte e tre le coorti. L'offerta gratuita del vaccino è garantita anche a tutte le coorti <1938.

I Dipartimenti di Prevenzione provvederanno all'invio dei dati aggregati sulle vaccinazioni effettuate nel corso dell'anno 2013 all'Osservatorio Epidemiologico Regionale esclusivamente via e-mail all'indirizzo malinf@oerpuglia.org **entro il 31 marzo 2014**, utilizzando la modulistica allegata alla presente.

Si invita alla massima diffusione della presente e della allegata Circolare Ministeriale alle strutture interessate, anche periferiche e, per il tramite dei Distretti Socio Sanitari, ai MMG e PLS.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Antonio Tommasi

Responsabile della P.O. "Igiene e Sanità Pubblica"
Maria Grazia Lopuzzo

Tel. [+39] 080.540.46.31
Fax. [+39] 080.540.92.94
E-Mail: mg.lopuzzo@regione.puglia.it

Allegato B

**MODULO PER LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ VACCINALI DEI MEDICI
COMPETENTI DELLE STRUTTURE SANITARIE**

ASL/AO/IRCCS/Ente Ecclesiastico/Struttura privata accreditata

Macrostruttura:

- Stabilimento Ospedaliero _____
- Distretto Socio Sanitario n. _____
- Dipartimento _____
- Struttura sovradistrettuale _____

Anno _____

Medico Competente _____

Telefono _____

E-Mail _____

| Dati della struttura | |
|---|--|
| Numero di operatori sanitari in servizio nella macrostruttura | |
| Numero di operatori sanitari sottoposti a prima visita | |
| Numero di operatori sanitari sottoposti a visita periodica | |
| Totale degli operatori sanitari visitati nell'anno | |
| Vaccinazione anti-epatite B | |
| Numero di operatori sanitari cui è stato verificato lo stato vaccinale nei confronti dell'Epatite B | |
| Numero di operatori già vaccinati con un ciclo completo contro l'epatite B (3 dosi) | |
| Numero di operatori vaccinati contro l'epatite B (3 dosi) | |





Regione Puglia



OSSERVATORIO
EPIDEMIOLOGICO
REGIONE PUGLIA

| Vaccinazione anti-varicella | |
|---|--|
| Numero di operatori sanitari cui è stato verificato lo stato di immunità/suscettibilità nei confronti della varicella | |
| Numero di operatori suscettibili alla varicella | |
| Numero di operatori vaccinati contro la varicella con 2 dosi di vaccino | |
| Vaccinazione anti-difto-tetano-pertosse | |
| Numero di operatori sanitari per cui è stato previsto il programma dei richiami della vaccinazione anti-difto-tetano-pertosse | |
| Numero di operatori sanitari da vaccinare nell'anno | |
| Numero di operatori sanitari vaccinati nell'anno | |
| Vaccinazione anti-influenzale | |
| Numero di operatori sanitari vaccinati contro l'influenza | |

Il Medico Competente

50
ALL2

RILEVAZIONE DELLA POPOLAZIONE ELEGGIBILE ALLA VACCINAZIONE

REGIONE: _____

| Categorie | Fasce di età | | | | | | | |
|--|--------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | 6-23 mesi | 2-4 anni | 5-8 anni | 9-14 anni | 15-17 anni | 18-44 anni | 45-64 anni | ≥ 65 anni |
| Soggetti di età pari o superiore a 65 anni | | | | | | | | |
| Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2) | | | | | | | | |
| Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico | | | | | | | | |
| Donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza | | | | | | | | |
| Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti | | | | | | | | |
| Medici e personale sanitario di assistenza | | | | | | | | |
| Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio | | | | | | | | |
| Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori | | | | | | | | |
| Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. | | | | | | | | |
| Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra) | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |

le celle grigie non vanno considerate

AL 3

RILEVAZIONE DEL NUMERO DI VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI STAGIONALI

ALLEGATO 3

REGIONE: _____

Tipologia di vaccino (per ogni tipologia di vaccino compilare una tabella diversa):

- Split
 Subunità
 Aduvato con MF59
 Aduvato con virosomi (virosoimiale)
 Intradermico

| Categorie | Fasce di età | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 6-23 mesi (2 dosi)* | 2-4 anni (2 dosi)* | 5-8 anni (2 dosi)* | 9-14 anni | 15-17 anni | 18-44 anni | 45-64 anni | ≥ 65 anni |
| Soggetti di età pari o superiore a 65 anni | | | | | | | | |
| Soggetti di età compresa fra 6 mesi e 65 anni con condizioni di rischio (vedi paragrafo 3.2.2) | | | | | | | | |
| Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico | | | | | | | | |
| Donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza | | | | | | | | |
| Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti | | | | | | | | |
| Medici e personale sanitario di assistenza | | | | | | | | |
| Familiari e contatti di soggetti ad alto rischio | | | | | | | | |
| Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori | | | | | | | | |
| Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani. | | | | | | | | |
| Popolazione generale (escluse le categorie di cui sopra) | | | | | | | | |
| Totale | | | | | | | | |

*LEGENDA: le celle grigie non vanno considerate:
* se vaccinato per la prima volta.*

ML4



REGIONE PUGLIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Lungomare Starita n.6 Bari

Prot. n° 169886/1 del 7 OTT. 2013

Bari, 7 OTT. 2013

Alla c.a.: Medici Medicina Generale ASL BA

Dirigenti Medici Serv. Igiene Pubblica

Direttori Distretti Socio Sanitari ASL BA

Oggetto: Vaccinazione antinfluenzale - campagna vaccinale 2013/2014

L'influenza, in Europa, si presenta con epidemie annuali durante la stagione invernale ed è associata ad elevata morbilità e mortalità. In Italia il fenomeno influenzale interessa ogni anno il 4-12% della popolazione e costituisce un rilevante problema di sanità pubblica. Le vaccinazioni rivestono un ruolo essenziale nel contenimento della diffusione dell'influenza stagionale, contribuendo in modo sostanziale alla prevenzione del fenomeno.

Con circolare del 19 agosto 2013, il Ministero della Salute – Dipartimento della Prevenzione e della Innovazione Direzione Generale della Prevenzione – ha trasmesso alle Regioni le disposizioni aventi nell'oggetto la "Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2013-2014". Nel documento si evidenzia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica quale obiettivo primario della vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e complicate di influenza e la riduzione della mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave: una strategia vaccinale basata su questi presupposti presenta un favorevole rapporto costo-beneficio e costo-efficacia.

Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, esitato all'interno della Conferenza tra Stato e Regioni nel febbraio 2012, ha definito -nell'ambito degli obiettivi specifici per la prevenzione della malattie suscettibili di vaccinazione, al punto 3- la necessità di "...garantire l'offerta gratuita delle vaccinazioni prioritarie per la popolazione generale..... ed in particolareil raggiungimento di coperture per la vaccinazione antinfluenzale del 75% come obiettivo minimo perseguibile e del 95% come obiettivo ottimale negli ultra sessantacinquenni e nei gruppi a rischio...".

La trascorsa campagna vaccinale antinfluenzale 2012/2013 è stata contraddistinta da una scarsa adesione e le coperture vaccinali registrate risultano assolutamente insoddisfacenti per quanto riguarda i soggetti di età superiore ai 65 anni (62% ASL BA) e per i soggetti con patologie croniche di età inferiore ai 65 anni. In vista dell'approssimarsi della campagna vaccinale antinfluenzale 2013/2014 questa ASL intende promuovere iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sull'importanza della vaccinazione anti-influenzale anche attraverso una più forte collaborazione con la medicina generale del territorio. Nell'ambito di questa iniziativa è stata programmata una strategia di supporto a favore della promozione dell'offerta vaccinale antinfluenzale attraverso la funzione e il ruolo dei MMG. La proposta è articolata su più livelli (materiale divulgativo per MMG, materiale per utenza da distribuire all'interno degli ambulatori medici e degli uffici vaccinali e dei distretti dell'ASL e da inserire in appositi diffusori unitamente ai poster, etc).


Inoltre, è prevista **una opportunità formativa ECM** disponibile su Sky e on line, per il medico di famiglia, sulla tematica vaccinazione antinfluenzale, stagione 2013-14. Il corso, che darà diritto a 3 crediti formativi, è attualmente in onda sul canale 440 della piattaforma Sky circa 2 volte a settimana per 6 mesi; i colleghi che non hanno Sky possono -in alternativa- seguire il corso on line. Per avere accesso al corso occorre semplicemente registrarsi (durante la creazione dell'account verrà chiesto il numero di iscrizione all'albo professionale); per partecipare all'accreditamento occorre completare il questionario sul sito <http://www.doctorslife.it/> . I contenuti del corso riguardano il virus influenzale (epidemiologia, rischi e costi collegati all'influenza, prevenzione) e la vaccinazione antinfluenzale (tipologie di vaccini, efficacia, sicurezza, circolare ministeriale e coperture, vantaggi per il medico vaccinatore). Le relazioni sono a cura di SIMMG e Università di Siena. Il provider è ADN Kronos Salute.

Cordialità

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione
Dott. Domenico Lagravinese



Il Direttore Generale
Angelo Domenico Colasanto





***AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE***